
ANVERSO (FRONT)

REVERSO (BACK)



	<		
lack			
	منتانات الاكتناب ثلاثية العقفات (مثل الأمينزيتيتيان) زيادة خطر الإصابة بامراض القلب والأوعية النموية كتأثيرات جانبية مع الفينايل الجنوبات	gsk	1 2
	قلوبتات الإرغوت (الإرغوتانين والميتللسيرغيد) [ريادة خطر الإصابة بالتسم الأرغوني الديوكسين والجليكوزايس القلبية [[لديوكسين والجليكوزايس القلبية]		
	في حال تم قحص البول غلال ٢٤ ساعة بعد تقابل جر عة من هذا المستحضر ، قد يوذي مستقلب إلى تغيّر في اللون مع تحديدات المختبر الحمض هدير وكسيدر ليكونك (HAA – 5) وحمض الفاتيليد تعريف ((VMA)		
	<u>الجو الفنيسين:</u> أم يتم تسجيل تقاعلت ملحوطة بين الجو الفنيسين والأدوية الأخرى. [الطحق (فرشناعة:	ر پائادول 🏈	30
	لا يجوز تتأول هذا المستحضر في فقرة الحمل من بون استشارة للطبيب. إن الدراسات الوبائية في الحمل البشري لم تثبت أي تأثيرات سلبية البار استِئامول الذي تفاوله بالجرعات الموصمي بها، غير أن المرضى يجب عليهم أثباع توصيات الطبيب في ما يخصُّ تفاول البار استِئامول.		
	لم يتم تحديد سلامة الفيقائل ايفيرين هيدروكفر رائيد والحراف الفينسن في فقرة المحل. يتم إفراز البارا استياس والفيقائل ايفيرين في حليب الأم ولكن بكميات تقلية. لا يجوز تناول هذا المستحضر في فقرة الرضاعة الطبيعوة من دون استشارة الطبيب.	كولد ع فلو	
		الكُلُّ فَيِّ واحد	3
	<u>التأثيرات الجانبية المحتملة.</u> هذه القاعلات تاررة وهياً.	اقراص مغلفة	
	توقّف عن تناول بانادول كوك & فلو الكل في واحد واستشر الطبيب فوراً في حال: اليار اسينامول:	معلومات عن المنتج	\bigvee
	 ردرد فعل مساسبة شال الطفح الجلدي أن الحكة، راجياتاً مع مشاكل في التنفس أو تورّم في الشفتين، واللسان، والحلق أو الوجه. حدوث طفح جلدي أو تقامل أن تقرّمات في الغي. حالات نفرة من الرفعة الو عقبة أو سلارة من تبقيز جونسن. 	ا یحقوی کا فرص مطلف من بدادرل کو لد کی فلو الکل فی و احد علمی: باز استیاد ان ۱۲۰ ملحم هروالفویستن ۱۰۰ ملحم	
	 واجهت مسبقاً مشاكل في التنفس أو تتشلح تصبي مع الأسبيرين أو مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية، وأصبت برد فعل مشابهه مع هذا المنتج. 	ایندای ایفررین میدروکلور اید ۵ ملجم المکونات الأخری:	
	– ظهر کمات غیر میر رو آو از برای آن ندره الحمیدات. – قصر فی وظیقهٔ الکید او آیا عراض او علامات مرتبطهٔ بذلک. – التهاب حالا فی الکنور باش.	الانكار أن السيليلور أن المورنيلي تشار الذي نشاء ما قبل الهجر، سوريات البوذاسيوم، تلك منقى، حمض السنياريك، السيكة الدائمية قدامية الموييان، الإنسان POYLs ركاناً المويان المويان المويان المويان المويان المويان المويان علاف العرب دايور موارز 1944ع المويان المويان 1974ع، طويان المويان المويان ١٠٠٠ موزه جودرات الانكارز.	
	<u>الفينايل ايفررين:</u> - اهتـملو لبات نفسية: العصيية والتهيّج، والأرق.	ما هو بخشوار که لانه کا فر اتلاق فران بدان براه در اما در وانها به استخدامه . افر اس بمذول کرد که افر اتلاق می واحد استخدال المحج هر مشی القصور الدین لمالات الزکام و افرد و الإنفاونز ا و السمال المسدري. کهاید انفازی افران به بخشوار نواز می نام کان کم واحد الان اما و انتخاب الم	
	— استطرابات الجهاز المسيري الصداع والفريقة والأرق. — استطرابات قابية را رتفاع مشغط الدم حمر انتظام ذات القاب، الخفقان. — استطرابات في الجهاز المهتمين والطائق والقريء والإمبال.	— التناول عن طريق الغم فقط. — لا تتخطى الجر عة المذكورة.	
	 اضطر ابات بصرية: توسع حدقة العين، جلوكومًا الزاوية المغلقة الحائة (الأكثر احتمالا أن يحدث عند المرضى الذين يعانون من جلوكوما الزاوية المغلقة). 	 لا تتناول هذا المستحضر الاكثر من ٥ أيام من دون استثمارة العلميب. المسافيين (بيما فيهم المسغير) والأطفال ما قوق ١٦ سفة. 	1
	— اضطرابات طابخ، وتعت الجاد: ردود فعل مصامية (مثل الطفح الجادي والأكزيما والشريء والنهاب الجاد الناشئ عن أشدة المصامية). — اضطرابات كالمورة والمسائلة الدولية: عمر البول، ولعقباس البول (الأكثر احتمالاً أن يحدث عند المرضمي الذين يعانون من انسداد المشاقة، مثل تضدم الدورمة!!).	— تشارل افر مسرن کارل المر مه کانگ با ساهات حسب الحاجة. — لانتشارل اکثر من ۱۸ آلو اس (۲۰۰۰ ملمج المراسينات ۲۰۰ ملمج جو افيزسين، ۴۰ ملمج طبابل ايفورين هيدروکلورايد) خلال ۲۶ ساعة. — کارل المر ماه در کال به اساعت علی الآلان.	1
	<u>الجو افنيسيون:</u> ان التأثيرات السلبية من بيانات الاختيارات الطبية والبيانات نادرة وتقتصر على عدد قليل من المرضى. إن تواتر هذه التأثيرات غير معروفة	للأطفال الذين تقل أعمار هم عن ١٢ سنة: - لا يجوز إعطاؤه للأطفال الذين تقل أعمار هم عن ١٢ سنة ما لم يو ص به الطبيب.	1
	ولكنها نادرة. - اضطرابات المهاتر الطناعي: ردود قعل حساسية. الوذمة الوعاتية. تقاعلات حساسية مفرطة. - الدراء لمرات التعد المرات التعد من الدرور	- لا يجوز استخدام مثا استخصر لدلاج اعراض الركام والإنفارذزا عند الأطفال القين تقلّ اعسارهم عن ٦ سلوات. كما أن الحديد من المكونات الفقالة الملاج السمال والركام التي تحتوي على الجو الينيسين والهيابال ايفورين لا يجوز استخدامها بدون وصفة طبية الأطفال الذين تقلّ أصدرهم عن ٢ سلوات.	1
	ه انتظار ايان في المهوز القائمي، والمسابر، موسابر، مسروة في القفان". - ("ما (إدلاغ" عن المسورة بالقائم من إنسان المسابية المؤرمة). - امتطار إنت المهاز الوشمي، القائران القور والأم في الهذار.	قبل تتنول اقراص بشادل كوك <u>& فلو الكل في واحد:</u> أ. لا تتناول اقراص بشادل كوك & فلو الكل في واحد في حال:	
\odot	 انسلر ابات جلدية وتحت الجلد: الطلع، الشرى. البر عق العلم الله الله الله الله الله الله الله ال	حساسية منط المثال المواقديات الواقيل الهنويات الويثال الهنويات أو لأي من مكاولات هذا المستحضر. تقابل أنورية أخرى محموظ قلجهيزا المستوادي (مثال مزيلات الإمقان، مثابطات الشهيرة، والمنشطات الفنيرة، مثل الأمقياتيين)	
	البار اسينامول: الجرعة المغرطة من البار اسينامول قد تسبب فقال الكبد. يقطلب اتخاذ تدابير طبية فورية في حالة الجرعة المغرطة، حتى وإن لم تظهر أعراض	 جلوكو ما الزاوية المخلفة (الضغط الزائد داخل عينيك). قصور حاد في الكيد أو الكلي، ارتفاع ضغط الدم، زيادة نشاط الغذة الدرقية، داء السكري، أمر اض القلب أو المرضى الذين يتداولون 	
	. الجرعة المتوطة. تناول جرعات متوطة علية تتجاوز ۱۰ غراماً من باراسيتامول قد يسبب تلف الكبد. إن ابتلاع ٥ جرام أن أكثر من الباراسيتامول قد يودّي إلى التف الكبد في حل كان الدريض محرّضا لمخاطر الحزي (إذا كان الدريض بثلثي علاجاً طويلاً بالكارليداز بيون أو الفيانيون، أو الفيانيون،	معندات (الاكتباب الأنفيل الطقات أو حاصرت مستقليف بهذا والموضي الذين يتذاولون أو قد تشاواوا خلال الاصوعين المخديين ماتبطات المواوليات أو كيمين (MAOO) ب. ويبد توفي الطفر مع بالداول كواند في قط الثان في واحد في هال:	
	أو البريميدون، أو الريفامييسين أو نبتة سائت جوزز أو أدرية أخرى تحثُ أنزيمات الكبد). أو المرضى الذين يتناولون جرعات مفوطة من الإيثانول أو المرضى المعرّضين للإصابة بنفاد الغلوتاتيون مثل الاضطر ابات الغذائية، والثليف الكيسي، والعدوى بفيروس نقص المفاعة	 المرضى الذين يعانون من المعدل المزمن أو الربو يجب عليهم استشارة الطبيب قبل تناول هذا المستحضر. على المرضى التوقف عن تناول هذا المستحضر واستشارة الطبيب في حال استمرار السعال أكثر من أيام وفي حال إعادة 	
	الشرقية والتجويع وفضال الوزر والشعب الشديد). أعراض العربة فلطر فقط أخلال أول 2 سامة قد تشمل: الشحوب، والغثيان، والقنود، وفقان الشهيدة، والألم في البطن. الأملة السريرية والمشترية اللف القيدة تكون واضعة بدح 11 إلى 28 سامة عليه الإلملاع وقد بحدث عنز انقطار في استطلاب المولوكرو والحمائين الأوضى.	الإضابة أبه أن كان مصدوباً أشمني ال الطبخ أن الصنداع المستدر." - لا تتلاقية مع يشول المسطر. ويعب استثارة الطبية بأن تقول منا المستحصر من قبل المرضى النون يعادن من الحالات الثانية:	
	في حالات التسم الحاد، إن الفشل الكبدي قد يتطور إلى اعتلال دماغي ونزيف، ونقص السكر في الدب ووالونمة الدماغية والوفاة, وإن الفشل الكلوي الحاد مع نخر أنبوبي حاد، الذي يوضحه الم الخاصرة، والبيلة الدموية والبروتينية، قد تتطور حتى في عدم وجود تلف الكبد الحاد. وقد تم	- تمنىكم خادة الابر وستاتا. - مرض النسداد الأو عبرة الدموية (ظاهرة رينود)	
	الرلاغ عن عنه انتقالم ضريات القلب والتهاب البنكوياس. العلاج: ينه في أن تماج إلهر عة المؤدمة فوراً عن طريق علما لمحدة بليها إعطاء الترياق إن- إسبتاليسيستين أو ميثيرتين بالوريد دون انتظار تنتقح معنوبات البل استأمرل في الهلازها.	ا امر امان القلب والأرع با السوية. - وجب توقي المدر من قبل المر من المان وتناوان أنوية مشادة لارتناع شعط الدير - في مل تعلي من هالات استقد المؤداتيون أو من القباب هذه كون استخدام الهزامواندول قد يزيد من خطر الإصابة بالحماص	
	عادة يمب إعطاء ترياق إضافي لتقادي مستويات البار استفادول المرتقعة في البلاز ما والوقت المنقضي بعد التسمر. في جميع الحالات التي يشتبه فيها تناول جرعة مفرطة، تكون الخناية الطبية العاجلة أمراً حاسماً للكبار وكذلك للأطفل، حتى وإن لم تلاحظ أبة علامات أو أعراض.	الأومنس. من أعراض الأصابة بالحماض الأومني: - الصعوبة في التنفس والتنفس العبيق والسريع.	
	الطبائل ليفرين العكمات والأعراض: إن أعراض الجرعة المغرطة من الطبنال ايفرون شبيعة بثلث المتكورة في قفرة الثانوات السليبة. الأعراض الإضافية قد تشغل المصمية والأرض و رفتاع ضنعط الدو ومن الممكن أيضاً أرتك يعلم الللب. في الحازات الشديدة قد تسبب الارتباك، الهلوسة، والتشاجات	- المشارك التقور. - فنان الشرك التقور التصار الماهليب فورة في حال الشعور بهيذه الأعراض.	
	و حد انشاط رفات الشب. غير أن الجرعة المطلوبة لحدوث تسمم خطير بالفيابال الهنريان قد تكون أكثار من نلك التي تسبب التسمم بالهار اسوندول. الملاح: يجب توفير علاج مذاسب طبياً. إن الارتفاع المطور في مشخط الدم قد يحتاج إلى الملاج بحاسرات ألفا مثل الفنو لامون.	 هذا المستحضر يحتوي على البار استأمول. لا تتناوله بالنز امن مع مستحضرات آخرى تحتوي على البار اسبتأمول. لا تتناوله مع مستحضرات أخرى لعلاج الإنفاوذا و الزكام أو مزيلات الإحتفان. 	
	الجو اليئيسين العلامات والأعراض: إن كميات كبيرة من الجو افينيسين قد تسبب الغثيان والثقور.	* هذا المستخصر جيوتي على اللاكتوز . على المرحم الينزي بعضرون من شلكل وراثية نداره الحم تحتل العالاكتوز ، أو نقص في باب اللاكتوز و أو سره المتصاص الجاركوز – العالاكتوز عصر تثان له طا الدواء. * بيب المشكرة الطبيب على الدور في مثلة الجرعة المعلمة، على غياب أي من أعراض الجرعة المعلومة، لأن التأخر في المصول على	
Λ	الملاح: بجب علاج التقر بينيال للسوائل رمز قبة الأكثر رفيقات إذا دعت الملجة. كيفية كنارين أوارس بالتكول كولد S قانو الكال أو واهد: يتشافى ترجة حرار أدا أن من ۲۰ حرجة نموية.	الدعم الطبي قد يؤدي إلى تلف كيدي خطير . * يجب استشارة الطبيب في حال استمر إز الأعراض أو تقامها أو ظهور أعراض جديدة.	
	حجم العبرة : ٢٤ قرص (٣ شريط Ax قرص) هذا المنتج بحموه شريط فقاعي مغلق. لا تستفدمه إذا كان أي من الشريط الفقاعي أو الغلاف الفويل مكسورًا .	* امشاه بیرینا عن منتقل آرشطر (الأطفاق. چ. منتقل آنویه آلفرن: الفرانستاندلیا:	1
0	لا تستقدم الدواء بعد أنتهاء مدة الصلاحية المذكورة على العبوة الغارجية والشريط، الدواء صالح حتى لغر يوم من شهر تاريخ انتهاء الصلاحة	يمكن تخريز تأثير الكروبة المنشدة للتطهط الرافر فيزر وخير مان الاصراف الكرمية الرافزية المستقبل القبل المنتقبل المتكون استقبل من وابداء فيما الاترزيدة العرص علك العرصية ليس لها أي تأثير ملوطراك الاتراف الأكان المشابة للبرانستانس التي التي عند عند ان سرعة المتعلق من المتحالات المتحالية عالم المتحالات المتحالية عالم المتحالية	1
3	هذا منتج دواسي • الدواء هو منتج له تاثير علي صحتك، و تقاوله بشكل مغاير للتعليمات قد يعرضك للخطر.	بين البار استامول و عدد من العقاقير الأخرى. و هذه التفاعلات غير خطورة طبياً في الاستخدامات الحادة بالجر عة الموصى بها. الفيدائي ايفير بن ميدرو كلو رايد:	
	 انم و رسفة الطبيب يدقة وكتاك ارشادات الاستعمال المساقة لك من الصوداني. ان الطبيب و الصوداني كلامها خبر بن في الافروقية و قو اندها و صفاهار ها. لا توقف قدرة العلاج المحددة في الوصفة الطبية من القاد فلسك. 	وجب استخدام الفيدل ايفورين هيدروكلور ايد بحذر بالنز امن مع أي من الأدوية الثالية بسبب القناعلات التي تم الإبلاغ عنها: مذيخات الدونو أمين أوكسويز (مما فيها المركلوريديد) ارتفاع في مضغط الديرسيب القناعلات ما بين الأطبات المحفرة للجهاز المسيئذاري	
\downarrow	 لا تكرر نفس الوصقة من دون أستثنارة طبيبك. احفظ الافرية بهينا عن منشول الافقفال مجلس وزراء الصحة الدون 	مثل القيابان ايفزر بن ومثيطات الموتو أمين أو كسيدين. الأمينات المحفّرة للجهاز السميثانوي إن التناول المنز امن للمنتجات التي تحتوي على الفيابان ايفررين مع أسينات أخرى	
<u> </u>	اتحاد الصبيادلة العرب	حمارة الهجهاز السبائاري قد يزر بد من خطر الإصبائة بامراض اللله والارعية السرية كالثارت حباسية . حاصرات البينا والمختلفات الأخرى لارتفاع منخط إلى القبايل الهزيرات واستخداد المتاليات الأخرى لارتفاع المتاليات	
	ا تعلامات التجارية مطركة أن مر خصة أمسالح مي ان كيه. منتج من قبل: سيت كلائين بيشاء إن ايه الكاتل - ليبتاييا الشركة المائكة لحق السروق: يحكمون مسيخ كلارن كولسو در هيئت كير (المملكة المتحدة)التجارية المحدودة ميديلسوكس ، المملكة المتحدم	الدم (بما فيها الدبريسوكون)، والغو البيئودين، منغط الدم. وقد يزداد خطر الإصابة بارتفاع شغط الدم وأمراض القلب والأوعية والريزريين، والمؤليلويا) التموية كتأثيرات جانبية.	
7	ا مارچه الشره بولود ۲۰۰ , GV2	6200000213818	
\bigvee		///////////////////////////////////////	
<u> </u>			

ALCALA
Site Additional Artwork Information Panel

Component description:
PROSP PANADOL ALL IN ONE ME

Reel unwind reference:
N/A

Real unwind reference:
N/A

HALEON

